

3 長薬発第 333 号  
令和 3 年 6 月 23 日

地域薬剤師会長 様  
同 薬局部会長 様  
病院診療所部会長 様

長野県薬剤師会  
会長 日野 寛明

アセトアミノフェンを含有する解熱鎮痛薬（OTC）の需給逼迫について

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、日本薬剤師会から、標題について別添のとおり通知がありました。  
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、よろしく願いいたします。

長野県薬剤師会  
担当：医薬品情報室 一志  
〒390-0802 松本市旭 2-10-15  
TEL0263-34-5511 FAX0263-34-0075  
E-mail：di@naganokenyaku.or.jp

日 薬 業 発 第 96 号  
令 和 3 年 6 月 22 日

都道府県薬剤師会担当役員殿

日 本 薬 剤 師 会  
副会長 田尻 泰典

アセトアミノフェンを含有する解熱鎮痛薬（OTC）の需給逼迫について

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省医政局経済課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

現在、新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、希望する全ての対象者への接種を本年10月から11月にかけて終了することを目指すとして、国を挙げて進められています。

本連絡は、ワクチン接種後の発熱・痛みへの対応として、アセトアミノフェンを含有する一部の解熱鎮痛薬（OTC）の需要が急激に高まっていることにより、一部の製品の品薄が生じたことから、新型コロナワクチン特設サイトに掲載されているQ&Aを改訂し、市販の解熱鎮痛薬としてアセトアミノフェンだけでなく、非ステロイド性抗炎症薬（イブプロフェンやロキソプロフェン）なども利用できることを明示したものです。

つきましては、消費者から相談があった際には当該Q&Aも参考として情報提供等を行うなど、需給逼迫の改善にご協力賜りたく、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。

事務連絡  
令和3年6月18日

日本製薬団体連合会  
米国研究製薬工業協会  
欧州製薬団体連合会  
局方薬品協議会  
日本OTC医薬品協会  
（一社）日本チェーンドラッグストア協会  
（公社）日本薬剤師会  
（一社）日本保険薬局協会  
（一社）日本薬局協励会  
（一社）日本医薬品卸売業連合会

御中

厚生労働省医政局経済課

#### アセトアミノフェンを含有する解熱鎮痛薬（OTC）の需給逼迫対応について

医薬品の安定供給については、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

今般、新型コロナワクチン接種後の発熱・痛みへの対応として、アセトアミノフェンを含有する一部の解熱鎮痛薬（OTC）の需要が急激に高まっており、一部の製品の品薄が生じています。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省新型コロナワクチン特設サイトにて掲載しているQ&Aを改訂し、市販の解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェンだけでなく、非ステロイド性抗炎症薬（イブプロフェンやロキソプロフェン）なども使用できることを明記しました。

貴会におかれましては、当該Q&Aを店頭販売等に適宜活用するなどにより、一部の解熱鎮痛剤の需給逼迫状況の改善にご協力下さるようお願いいたします。

#### ○ 新型コロナワクチンQ&A (<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0007.html>)

Q. ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか。

A. ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬（※）で対応いただくことも考えられますが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

- ・他のお薬を内服している場合や、妊娠中、授乳中、ご高齢、胃・十二指腸潰瘍や腎機能低下など病気治療中の場合（飲める薬が限られていることがあります。）
- ・薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある場合
- ・激しい痛みや高熱など、症状が重い場合や、症状が長く続いている場合
- ・ワクチン接種後としては典型的でない症状がみられる場合（ワクチン接種後に起こりやすい症状や起こりにくい症状については、こちらをご覧ください。）

なお、ワクチンを受けた後、症状が出る前に、解熱鎮痛薬を予防的に繰り返し内服することについては、現在のところ推奨されていません。

（※）市販されている解熱鎮痛薬の種類には、アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬（イブプロフェンやロキソプロフェン）などがあり、ワクチン接種後の発熱や痛みなどにご使用いただけます。（アセトアミノフェンは、低年齢の方や妊娠中・授乳中の方でもご使用いただけますが、製品毎に対象年齢などが異なりますので、対象をご確認のうえ、ご使用ください。）

以上