

県民で力をあわせ「デルタ株」感染拡大の危機を乗り越えるために

7月以降、感染力の強いデルタ株が猛威を振るい、長野県内においてもこれまでにないスピードで新型コロナウイルスの新規感染者が増加しています。今に至る第4波までは、県民の皆さまに懸命に対策に取り組んでいただいたおかげで、医療崩壊を招くことなく、なんとか乗り切ることができました。しかし、デルタ株による第5波は、すでに全国の大都市圏を中心にこれまでに類をみない感染爆発を引き起こしており、長野県内も同様の事態となる恐れがあります。さらに、このデルタ株は、従来株より感染力が強だけでなく、重症化リスクを高める可能性があるともいわれています。

私たちはこれまでも、それぞれの立場で県民の皆さまに感染対策を呼びかけ、取り組んできました。しかしながらデルタ株による第5波に対応するためには、これまでの意識を変え、さらに真摯にそして厳格に対策に取り組んでいかなければなりません。

今、必要なのは、一人ひとりの賢明で適切な行動の選択です。その行動が、自分自身を守り、大切な人を守り、社会を守ることにつながります。あらためて今できることを、同僚、友人、家族等とともに考え、話し合い、共有し、力を結集しましょう。そうすれば、きっとこの危機も乗り越えられるはずです。

そのため私たちは、ここに「新型コロナ『デルタ株』と闘う県民共同宣言」を発出し、自ら対策に取り組むとともに、企業、団体、個人を含む多くの方々の賛同を募り、一刻も早いコロナ禍からの脱却を目指します。

適切な対策が、多くの命、地域の医療と経済を守ることになります。ぜひ多くの方々に賛同いただき、感染対策に取り組んでいただくようお願い申し上げます。

令和3年8月12日

発出者

長野県市長会、長野県町村会、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、
長野県看護協会、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、
長野県商工会連合会、日本労働組合総連合会長野県連合会、長野県PTA連合会、
長野県高等学校PTA連合会、長野県私立高等学校PTA連合会、長野県養護学校PTA連合会、
長野県教育委員会、長野県議会、長野県

新型コロナ「デルタ株」と闘う県民共同宣言

— 私たちの大切な命と暮らしを守るため、ともに行動しましょう —

私たちは、協力して次のことに取り組み、多くの県民の皆さまに呼びかけながら、デルタ株によってこれまでにない大きな波となりつつある新型コロナ第5波を乗り越えていくことを宣言します。

1. 適切な感染対策を行い、感染拡大を食い止めます

デルタ株やワクチンなど新型コロナウイルスに関する正しい知識や情報を、職場や学校、家族や地域で学び、話し合うことを通じて、デマや根拠のない噂に惑わされることなく、適切な感染対策を主体的に行い、感染拡大を食い止めます。

2. 思いやりと支えあいの心を持ち、社会経済活動を行います

各種店舗や施設を経営・運営する方々やその利用者等は、事業者ガイドラインや利用者としてのマナーやルールを守り、行政は、状況に応じた適切な対策や要請等を行うことにより、それぞれの立場や状況を思いやり、支えあいの心を持って、感染状況に応じた社会経済活動を行います。

3. 希望する方への接種を進めるため、デルタ株にも有効なワクチン接種に協力します

新型コロナワクチンの有効性や副反応に関する情報を正確に理解するとともに、市町村や県が実施する接種や職域接種に協力します。

なお、接種されない方々に対する配慮も忘れません。


4. 命と暮らしを守ってくれている、医療従事者をはじめとするエッセンシャルワーカーの皆さまへの感謝を忘れません

5. 誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

“デルタ株”を知り 最大限の対策を

1 従来株と次元の異なる強力な感染力


従来株に比べ感染力が1.32倍高いと推定されたアルファ株よりもさらに1.5倍高い可能性があります



2 重症化しやすくなる可能性あり

従来株に比べて重症化リスクが1.4倍高いといわれるアルファ株よりもさらにリスクが高くなっている可能性があります。

3 若年層（特に20代）の感染者が大幅増



マスクを外して会話



窓が無い、網戸が無いなど、換気ができない場所にいる




マスクをしていても換気が不十分

こんな時ありませんか？

≪ やってるつもりは要注意 ≫



少し体がだるいが、日程変更が大変なので予定どおり帰省



体調が悪いけど、これぐらいは平気？

マスクをしていても距離が近い・声大きい



やってるつもりは要注意

検索

その他の「やってるつもり」は
[コチラ](#)




適切な対応は裏面へ

デルタ株を意識し適切な対策を

「ゼロ密」を徹底

三つの密（密閉、密集、密接）が重ならない、一つの密でも、感染リスクがあります。感染性が高いとされているデルタ株への対策のためにも、「ゼロ密」を徹底しましょう。



マスクの着用

✓ 会話の際は必ずマスクを着用しましょう

ウイルスは、目、鼻、口から入ってきます。マスクは顔との隙間が無いように着用し、鼻もしっかり覆いましょう。

✓ できるだけ不織布マスクを着用しましょう

不織布マスクに比べ、布、ウレタン製のマスクは効果が落ちると言われています。また、マウスシールド、フェイスシールドはマスクの代わりになりません。

✓ マスクをしていても距離を取りましょう

マスクをしていても、隙間から飛沫が出ることがあります。マスクをしている場合でも最低1メートルの距離を確保するよう心がけましょう。



十分な換気

✓ こまめな換気を心がけましょう

職場やお店、教室、自動車の中など、常に換気を意識しましょう。屋内では30分に1回以上、数分間程度、窓を全開にしましょう。

✓ 換気が不十分な空間は避けましょう



手洗い・手指消毒

✓ 適切なタイミングで行いましょう

食事前など、手が目、鼻、口に触れる可能性を意識し、手洗いや手指消毒を行いましょう。

✓ 適切な方法で行いましょう

- ・手洗いは、石けんやハンドソープで10秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐ
- ・手洗後は清潔なタオルやペーパータオルで水分をよく拭き取る
- ・アルコール消毒液は必ず手を乾かしてから使用する
 - ※外出の際には、消毒用アルコールを携行しましょう
 - ※アルコールに過敏な方は使用は控えてください



早めの受診

✓ 発熱やせきに限らず、のどの違和感や鼻水など、体調が優れない場合は、早めにかかりつけ医等にまずは電話で相談しましょう

早期発見、早期対応が重症化予防と感染拡大防止につながります。経営者の方は、休みやすい環境やテレワークの推進など、無理に出勤しないで済む環境を整えましょう。

POINT

車中の感染対策のポイント

車中は、「密閉」かつ「密接」になりがちです。エアコンによる外気モードや窓を開けての換気だけでなく、マスクを着用して会話を控えめにするなど、飛沫対策をしましょう。



ワクチン接種後も感染防止対策を継続

多くの人がワクチン接種を完了するまでには時間がかかることから、ワクチン接種後も基本的な感染防止対策を継続してください。

教えて!!



発行・監修：
長野県 新型コロナウイルス
ワクチン接種アドバイザーチーム
(2021.4発行/2021.6改定)
接種は無料 (公費負担)

ファイザー
社製ワクチン
ver.

新型コロナウイルスワクチン

- どんな流れ?
- 効果は?
- 副反応は?
- こんな場合接種できるの?

こんな人は接種できません

- ✓ 他のワクチンを2週間以内に接種
- ✓ 明らかに発熱 (37.5℃以上)
- ✓ 重い急性疾患にかかっている (ひどい風邪症状や胃腸炎症状など)

インフルエンザワクチン接種の時期Aに注意!

接種1回目

このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません

副反応が出ても2回目接種OK

3週間(21日)あけて

2回接種することで望ましい効果が得られます

1回目と2回目は同じ種類のワクチンを接種

接種2回目

3週間あけて2回目の接種
2回目も同じ箇所に打つことに問題なし

接種当日と翌日は可能なら予定を空けておくのがおすすめ

接種後2日目

接種後

感染対策はいままで同様

感染対策はいままで同様継続を

接種後も感染対策を。

- 何年も効果が持続するのにはまだ不明
- 多くの方がワクチン接種完了するまで時間がかかる

接種後も従来の感染対策 (マスク、人混みを避ける、ソーシャルディスタンスなど) を継続しましょう。

接種当日

ワクチン接種

接種後 待機

15分

30分

● 重いアレルギーなし15分待機
あり30分待機

花粉症や喘息などのよくあるアレルギーの方は15分待機で大丈夫

接種後 当日

- 入浴OK
- 激しい運動は避ける
- 過度なアルコール摂取は控える

新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。腫れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。

1回目で副反応が出ても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。

ワクチンの接種に関する不安や、副反応についての相談など

長野県ワクチン接種相談センター

TEL: **026-235-7380** 24時間休
FAX: **026-403-0320** 9:00-17:00 (土日・祝日を除く)

接種の予約・手続きの方法など
各市町村接種相談窓口

接種に関する個別の事前相談
かかりつけ医

参考となるWEB

- 厚生労働省 新型コロナワクチンについてのQ&A
- こびナビ 新型コロナウイルス感染症やそのワクチンに関する正確な情報提供プロジェクト (医師が中心となって運営)
- 「コロワクんの相談室」チャットボット ワクチンに関するよくある質問に答えるLINEのチャットボットを利用した情報提供 (医師が中心となって運営)

ワクチンの効果って?

(ファイザー社 / ピオンテック社)

- ✓ 重症化予防効果あり
- ✓ 高齢者への有効性も高い
- ✓ 人にうつす可能性を減らす効果が期待されている

発症予防効果 95%

発症するリスクが 1/20

100人中95人に効くという意味ではなく、接種した人の発症率が接種しなかった人の発症率より95%少ないという意味。

未接種 100

接種 5

他のワクチン... 麻疹 ワクチン 95%
インフルエンザ ワクチン 50%

新型コロナウイルスは非常に効果が高いワクチンです

いつから効くの?

1回目の接種から2週間は打っていない人と同じと考えて行動を

1回目を接種して2週間経ってから効果が始まります。2回目を接種して7日目以降から十分な免疫ができるとされています。なお、一度新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチンに比べて得られた免疫は弱い可能性があるため、接種することが望ましいです。

十分な効果

1 接種 1回目

2 接種 2回目

接種後 7日目以降

感染対策は続ける

ワクチンの副反応って?

ワクチン接種が原因で起こる反応のことだよ



新型コロナワクチン(ファイザー社)接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起こりやすいですが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

いつ出る? 接種した1~2日後に副反応が出現することがありますが、ほとんどは3日以内に回復します。特に2回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、接種当日と翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

どんな症状? 主に接種部位の痛み・腫れ・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。接種直後の痛みはそれほど強くありません。発熱時は解熱剤を使っても構いません(ワクチンの効果は下がりません)。解熱剤はアセトアミノフェンを含むものをおすすめ。

主な副反応

- 接種時の痛み
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 関節痛
- 吐き気

副反応が出てもよくある症状なら様子を見て落ち着いた判断を

体調が回復しない場合は?

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら上気道炎(風邪)や新型コロナウイルス感染症等の可能性も。(これらがワクチンの副反応で通常見られないため)

こんな時は医療機関に相談

- ☑ 接種後2日以上経っても発熱しない
- ☑ 症状が重い

アナフィラキシーって?

簡単に言うと「重いアレルギー反応」のことで、ワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現する場合を「アナフィラキシー」といいます。新型コロナウイルスワクチンで起こる頻度は20万接種に1回で、70%が15分以内、90%が30分以内にとされます。

- 皮膚・粘膜症状(発疹、発赤、かゆみ)
- 消化器症状(腹痛、嘔吐)
- 循環器症状(血圧低下・意識障害)
- 呼吸器症状(呼吸が苦しい、呼吸をするときゼイゼイする など)

多いのは皮膚・粘膜症状(80~90%)

アナフィラキシーショックって?

アナフィラキシーのうち血圧低下や意識レベル低下を伴うもの。

アナフィラキシーは治療できます

治療により回復し、後遺症は残りません。



アドレナリンの筋肉注射

必要なら酸素投与

横になって安静

こんな場合接種できるの?

接種	接種	接種
当日の発熱	×	当日、明らかに発熱(37.5℃以上)している場合、接種不可。
重い急性疾患	×	ひどい風邪症状や胃腸炎症状など、急性疾患の強い症状がある場合、接種不可。
他のワクチンを2週間以内に接種	×	インフルエンザなど他のワクチンを2週間以内に接種している場合、接種不可。(ワクチン接種後も、2週間は他のワクチンを接種することはできません。)
アレルギー	○	食物(卵含む)・ペット・ハウスダストのアレルギーや、経口薬へのアレルギーがある場合でも接種は可能。
花粉症	○	花粉症でも接種は可能。
基礎疾患	○	心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある方はコロナで重症化しやすい。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
妊娠中	○	妊娠中でも接種可。妊娠中は感染で重症化のリスクがあり、接種を推奨。不安な場合はかかりつけ医に相談を。お腹の中の赤ちゃんに悪い影響が出たり、将来妊娠しにくくなることは考えられておらず、海外からもそのような報告はない。
授乳中	○	現時点で特段の懸念が認められているわけではなく海外でも接種の対象。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
12歳未満	×	ワクチンは12歳以上で承認されており、現在は接種対象ではないが、将来的には対象年齢が広がる可能性も。
薬を内服中	○	内服中の薬により接種できないということはない。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
…抗凝固薬	○	抗凝固薬(血液をさらさらにする薬)を飲んでいる場合は2分以上接種した場所をしっかり押さえる。
手術後	○	直後でなければ基本的に可能。投薬中の方など、かかりつけ医と相談を。
1回目の接種後副反応が出た	○	アナフィラキシーなど重い症状でなければ、強い腫れ・熱などの副反応があっても、2回目は可能。同じ場所に接種可能。
1回目の接種後アナフィラキシー	×	アナフィラキシーとはワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現すること。接種不可。 皮膚・粘膜症状(発疹、発赤、かゆみ) 呼吸器症状(呼吸苦、喘鳴など) 循環器症状(血圧低下・意識障害) 消化器症状(腹痛、嘔吐)

参考
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20210120-00217893/
CDC/Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines
Currently Authorized in the United States

CDC/Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Questions
ACIP, COVID-19 vaccine safety update, January 27, 2021
CDC/Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A

教えて!!



発行・監修: 長野県 新型コロナウイルス ワクチン接種アドバイザーチーム (2021.6 発行) 接種は無料 (公費負担)



新型コロナウイルスワクチン

どんな流れ?

効果は?

副反応は?

こんな場合接種できるの?



こんな人は接種できません

- ✓ 他のワクチンを2週間以内に接種
- ✓ 明らかに発熱 (37.5℃以上)
- ✓ 重い急性疾患にかかっている (ひどい風邪症状や胃腸炎症状など)



接種当日と翌日は 可能なら予定を 空けておくのが おすすめ

接種1回目

このワクチンを 接種しても 人の遺伝子に影響が 出ることはありません

副反応が出ても 2回目接種OK

4週間(28日)あけて

2回接種することで 望ましい効果が得られます

1回目と2回目は 同じ種類のワクチンを接種

接種2回目

4週間あけて 2回目の接種 2回目も同じ箇所 に打つことに 問題なし

接種後

感染対策は いままで同様 継続を

接種後も感染対策を。

- 何年も効果が持続するのにはまだ不明
- 多くの方がワクチン接種完了するまで時間がかかる

接種後も従来の感染対策 (マスク、人混みを避ける、ソーシャルディスタンスなど) を継続しましょう。

接種当日

ワクチン接種

接種後 待機

接種後 15分

接種後 30分

● 重いアレルギーなし15分待機 あり30分待機

花粉症や喘息などのよくあるアレルギーの方は15分待機で大丈夫

接種後 当日

- 入浴OK
- 激しい運動は避ける
- 過度なアルコール摂取は控える

新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。腫れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。



1回目で副反応が出ても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。

相談窓口

ワクチンの接種に関する不安や、副反応についての相談など
長野県ワクチン接種相談センター
TEL: **026-235-7380** 24時間無休
FAX: **026-403-0320** 9:00-17:00 (土日・祝日を除く)

接種の予約・手続きの方法など
各市町村接種相談窓口

接種に関する個別の事前相談
かかりつけ医

参考となるWEB

厚生労働省
新型コロナウイルス
についてのQ&A

こびナビ
新型コロナウイルス感染症や
そのワクチンに関する正確な
情報提供プロジェクト
(医師が中心となって運営)

「コロワクんの相談室」
チャットボット
ワクチンに関するよくある質問に答える
LINEのチャットボットを利用した情報
提供 (医師が中心となって運営)


ワクチンの効果って?

発症予防効果

(モデルナ社)

- ✓ 重症化予防効果あり
- ✓ 高齢者への有効性も高い
- ✓ 人にうつす可能性を減らす効果が期待されている

94%



他の ワクチン だとい... 麻疹 ワクチン 95%

インフルエンザ ワクチン 50%

新型コロナワクチンは非常に効果が高いワクチンです

いつから効くの?



1回目の接種から 2週間は 打っていない人と同じ と考えて行動を

1回目を接種して2週間経ってから 効果が始まります。2回目を接種して14日目以降から 十分な免疫ができるとされています。 なお、一度新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチン に比べて得られた免疫は弱い可能性があるため、接種する ことが望ましいです。

十分な効果

1 接種 1回目

2 接種 2回目

接種後 14日目 以降

感染対策 は続ける

ワクチンの副反応って?

ワクチン接種が原因で起こる反応のことだよ



新型コロナワクチン (モデルナ社) 接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起こりやすいですが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

いつ出る? 主な副反応は通常 1～2 日 で出現し、3 日以内に改善することが多いです。接種後 1 週間ほどしてから (他の副反応より遅めのタイミングで) 腕が赤く腫れることがあり、この反応は平均 4～5 日で改善します。特に2回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、接種当日と翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

どんな症状? 主に接種部位の痛み・腫れ・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。接種直後の痛みはそれほど強くありません。発熱時は解熱剤を使っても構いません(ワクチンの効果は下がりにません)。解熱剤はアセトアミノフェンを飲むものがおすすめ。

主な副反応

- 接種時の痛み
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気 (1～2日後に出ることがある)
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 関節痛
- 吐き気

体調が回復しない場合は?

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら上気道炎 (風邪) や新型コロナウイルス感染症等の可能性も (これらがワクチンの副反応で通常見られないため)

こんな時は医療機関に相談

- ✓ 接種後 2 日以上経っても解熱しない
- ✓ 症状が重い

アナフィラキシー?

簡単に言うと「重いアレルギー反応」のことで、ワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現する場合は「アナフィラキシー」といいます。新型コロナウイルスワクチンで起こる頻度は35万接種に1回で、70%が15分以内、90%が30分以内で起こるとされます。

90%が30分以内に起こるとされています

- 皮膚・粘膜症状 (発疹、発赤、かゆみ)
- 消化器症状 (腹痛、嘔吐)
- 循環器症状 (血圧低下・意識障害)
- 呼吸器症状 (呼吸が苦しい、呼吸をするときにゼイゼイする など)

多いのは皮膚・粘膜症状 (80～90%)

アナフィラキシーショックって?

アナフィラキシーのうち血圧低下や意識レベル低下を伴うもの。

アナフィラキシーは治療できます

治療により回復し、後遺症は残りません。



こんな場合接種できるの?

接種	接種	接種
当日の発熱	×	当日、明らかに発熱 (37.5℃以上) している場合、接種不可。
重い急性疾患	×	ひどい風邪症状や胃腸炎症状など、急性疾患の強い症状がある場合、接種不可。
他のワクチンを2週間以内に接種	×	インフルエンザなど他のワクチンを2週間以内に接種している場合、接種不可。(ワクチン接種後も、2週間は他のワクチンを接種することはできません。)
アレルギー	○	食物 (卵含む)・ペット・ハウスダストのアレルギーや、経口薬へのアレルギーがある場合でも接種は可能。
花粉症	○	花粉症でも接種は可能。
基礎疾患	○	心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある方はコロナで重症化しやすい。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
妊娠中	○	妊娠中でも接種可。妊娠中は感染で重症化のリスクがあり、接種を推奨。不安な場合はかかりつけ医に相談を。お腹の中の赤ちゃんに悪い影響が出たり、将来妊娠しにくくなることは考えられておらず、海外からもそのような報告はない。
授乳中	○	現時点で特段の懸念が認められているわけではなく海外でも接種の対象。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
12歳未満	×	ワクチンは12歳以上で承認されており、現在は接種対象ではないが、将来的には対象年齢が広がる可能性も。
薬を内服中	○	内服中の薬により接種できないということはない。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
…抗凝固薬	○	抗凝固薬 (血液をさらさらにする薬) を飲んでいる場合は2分以上接種した場所をしっかり押さえる。
手術後	○	直後でなければ基本的に可能。投薬中の方など、かかりつけ医と相談を。
1回目の接種後副反応が出た	○	アナフィラキシーなど重い症状でなければ、強い腫れ・熱などの副反応があっても、2回目は可能。同じ場所に接種可能。
1回目の接種後アナフィラキシー	×	アナフィラキシーとはワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現すること。接種不可。 皮膚・粘膜症状 (発疹、発赤、かゆみ) 呼吸器症状 (呼吸苦、喘鳴など) 循環器症状 (血圧低下・意識障害) 消化器症状 (腹痛、嘔吐)

参考
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389>
 忽那龍志 (https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20210120-00217893/) CDC Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States
 CDC.Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Questions
 ACIP_COVID-19 vaccine safety update, January 27, 2021
 CDC Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A