

3 長薬発第 1020 号
令和 3 年 12 月 28 日

地域薬剤師会長 様
同薬局部会長 様
病院診療所部会長 様

長野県薬剤師会
会長 日野 寛明

「ラゲブリオカプセル 200mg」の使用に関する注意喚起について

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、日本薬剤師会から、標題について別添のとおり通知がありました。
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、よろしくお願いいたします。

長野県薬剤師会
担当：医薬品情報室 一志
〒390-0802 松本市旭 2-10-15
TEL0263-34-5511 FAX0263-34-0075
E-mail : di@naganokenyaku.or.jp

日薬情発第 181 号
令和 3 年 12 月 27 日

都道府県薬剤師会担当役員殿

日本薬剤師会
担当副会長 川上 純一

「ラゲブリオ[®]カプセル 200mg」の調剤に関する注意喚起について

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ラゲブリオ[®]カプセル 200mg」(有効成分:モルヌピラビル)は、SARS-CoV-2 感染症に用いる薬剤として、12 月 24 日に特例承認されたところです。

国からの通知を含め、ラゲブリオ[®]カプセル 200mg の使用に関しては、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について」(日薬業発第 361 号 令和3年 12 月 24 日)としても通知しておりますが、本剤の調剤に際しては、下記の点にご留意いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

会務ご多用のところ恐縮ながら、本剤の調剤・備蓄等に関与する貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。

記

- 上記通知に含まれる厚労省の通知や、添付文書等の記載事項を十分考慮すること。
また、特に以下の点に留意すること。
 - あらかじめ患者又は代諾者に文書による同意があるかを確認すること。
 - 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと
 - 妊娠可能な女性の場合、本剤投与中及び投与後一定期間の適切な避妊を行わせること。
 - SARS-CoV-2 感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること。
 - 5 日間服用すること (勝手に中断・中止しないこと)
- メーカーに確認したところ、本剤はサイズが大きい (21.7x7.64mm) が、脱カプセルや粉碎時の安定性等データが存在しないため、カプセルのまま投与する前提とされている。

以上