

4 長薬発第 336 号
令和 4 年 6 月 29 日

地域薬剤師会長 様
同 薬局部会長 様

長野県薬剤師会
会長 日野 寛明

基礎疾患を有する者等への新型コロナワクチン 4 回目接種の周知について（依頼）

平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記について、長野県健康福祉部長から別添のとおり通知がありました。

新型コロナワクチン 4 回目接種については、重症化予防を目的に下記対象者へ接種が開始されましたが、今後、接種の本格化に当たって、重症化リスクが高い基礎疾患を有する者等への周知が課題となっていることから、接種対象者が利用する機会の多い薬局における周知が依頼されました。

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員に、下記周知用チラシの掲示や配布等へのご協力方、ご周知くださいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、チラシの配布等について、各地域振興局（または保健所）から各地域薬剤師会へ直接連絡がされるとのことですので、ご対応方、併せてよろしくお願いいたします。

記

1 4 回目接種対象者

3 回目接種から 5 か月経過した次に該当する者

(1) 60 歳以上の者

(2) 18 歳以上で基礎疾患を有する者（基礎疾患の例示は別添チラシ参照）

その他重症化リスクが高いと医師が認める者

2 周知用チラシ

別添「新型コロナワクチン 4 回目接種により、高い重症化予防効果が得られます」

（発行・監修：長野県新型コロナウイルスワクチンアドバイザーチーム）

一般社団法人 長野県薬剤師会 事務局長 中島 / 保険医療課 桐山 〒390-0802 松本市旭 2-10-15 TEL0263-34-5511 FAX0263-34-0075 E-mail : hoken3@naganokenyaku.or.jp
--

4感ワ号外
令和4年(2022年)6月27日

一般社団法人長野県薬剤師会長 様

長野県健康福祉部長

基礎疾患を有する者等への新型コロナワクチン4回目接種の周知について(依頼)

日頃は、県の健康福祉行政にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナワクチン4回目接種については、重症化予防を目的に下記対象者へ接種が開始されたところです。

今後、接種の本格化に当たって、重症化リスクが高い基礎疾患を有する者等への周知が課題となっています。

接種券の発行に当たっては、接種意向確認の事前調査の実施やこれまでの接種実績に基づく対象者の把握等、地域の実情にあわせて工夫を行っているところですが、接種対象者が利用する機会の多い薬局等における周知も効果的であると考えております。

つきましては、上記の趣旨についてご理解をいただくとともに、貴会会員へ下記周知用チラシの掲示や配布等についてご協力いただけるよう、周知をお願い申し上げます。

なお、周知用チラシ(印刷物)の完成後、地域ごとに会員薬局等への配布方法について、ご相談させていただき予定しておりますので、ご配慮のほどあわせてお願い申し上げます。

記

1 4回目接種対象者

3回目接種から5か月経過した次に該当する者

(1) 60歳以上の者

(2) 18歳以上で基礎疾患を有する者(基礎疾患の例示は別添チラシ参照)

その他重症化リスクが高いと医師が認める者

2 周知用チラシ

別添「新型コロナワクチン4回目接種により、高い重症化予防効果が得られます」

(発行・監修:長野県新型コロナウイルスワクチンアドバイザーチーム)

長野県健康福祉部感染症対策課ワクチン接種体制整備室
(室長) 田中 英児 (担当) 田中 潤、清水 萌美
電話 026-235-7319 F A X 026-235-7334
Eメール corona-vaccine@pref.nagano.lg.jp

新型コロナウイルス 4回目接種により、 高い重症化予防効果 が得られます



対象者 3回目接種から**5ヵ月**が経過した、

- 1 60歳以上の方
- 2 18歳以上で **基礎疾患を有する方**
その他重症化リスクが高いと医師が認める方



「基礎疾患を有する」
「その他重症化リスクが高い」とは？


接種対象に該当するか否かは、**かかりつけ医や
身近な医療機関**での定期的な受診の際などにご相談ください。

基礎疾患の例示 ※基礎疾患の例示(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」引用)

- 以下の病気や状態の方で、通院・入院している方
慢性の呼吸器の病気 / 慢性の心臓病(高血圧を含む) / 慢性の腎臓病 / 慢性の肝臓病(肝硬変等) / インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 / 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く) / 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む) / ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている / 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 / 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) / 染色体異常 / 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態) / 睡眠時無呼吸症候群 / 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持している場合)
- 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方

ワクチンの効果は？

オミクロン株流行期において、
重症化予防効果が報告されています。
海外の研究では、60歳以上の方へファイザー社
ワクチンを4回接種した場合、接種した人の重症化
率は、3回接種した人と比較して、62%少ないとの
報告があります。 ※重症化予防効果62%、入院予防効果68%、死亡予防効果74%



重症化予防効果62%とは…

3回接種した人が10人重症化したと仮定した場合、その人たちがもし4回目接種していれば約4人で済んでいたはず、という意味

4回接種していれば
重症化する人は**4人**で済む

持続性は？

ファイザー社ワクチンの4回接種による重症化予防効果が、6週間経過しても低下せず維持されていたことが報告されています。

※3回目接種から4ヵ月経過した60歳以上の方にファイザー社ワクチンを4回目接種した場合




6週間経過しても
低下せず維持

重症化予防効果が
一定期間維持されると
報告されています



副反応は？

海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて、重大な副反応は認めなかったと報告されています。



18歳以上へのワクチン接種後、21日目までに現れた症状

報告割合	ファイザー社・モデルナ社	
50%	痛み(疼痛) 78.8%	
10~50%	だるさ(倦怠感) 33.2%	しこり・はれ(硬結・腫脹) 12.0%
	筋肉痛 24.5%	
	頭痛 21.5%	
1~10%	関節痛 8.4%	紅斑・発赤 8.0%
	37.5℃以上の発熱 6.6%	知覚障害 1.5%
	リンパ節腫脹 4.7%	アレルギー反応 1.0%

こんな場合は医療機関の受診を！

接種を受けてから数日経っても体調が改善しない場合や、症状が重くつらい場合は、身近な医療機関等を受診してください。



☑ 接種券の発行は？

- 60歳以上の方には、3回目接種から5ヵ月経過後を目安にお手元に届きます。
- 60歳未満の基礎疾患を有する方への接種券の発行は、申請が必要であるなど、市町村によって取り扱いが異なります。発行手続きなどについては、現在住民票がある市町村へお問合せください。

☑ かかりつけ医で接種したいけど、住民票の登録住所と違う場合は？

ワクチン接種は、住民票所在地での接種が原則とされていますが、基礎疾患を有する方が治療中の医療機関で接種を受けることも可能とされています。必要な手続き等については、接種を受けたい市町村にご確認ください。なお、県が設置する会場については、住所地にかかわらず接種が可能です。

相談窓口

ワクチンの接種に関する不安や、副反応についての相談など
長野県ワクチン接種相談センター

TEL: 026-235-7380 24時間無休

FAX: 026-403-0320 9:00-17:00(土日・祝日を除く)

接種の予約・手続きの方法など
各市町村接種相談窓口

接種に関する個別の事前相談
かかりつけ医

参考となるWEB



厚生労働省
新型コロナウイルスワクチンについてのQ&A



こびナビ
Gov-Nav
新型コロナウイルス感染症やそのワクチンに関する正確な情報提供プロジェクト(医師が中心となって運営)



「コロクんの相談室」
チャットボット



ワクチンに関するよくある質問に答えるLINEのチャットボットを利用した情報提供(医師が中心となって運営)